

インフルエンザによるサービス利用休止期間について

ハピニティー

インフルエンザに罹患した場合、「発症後5日間が経過し、かつ解熱後2日間」まで利用を休止していただきます。どんなに早く熱が下がっても、最低、発症した後5日は利用休止となります。

発症日は、病院を受診した日ではなく、インフルエンザ症状(38℃以上の発熱等)が始まった日です。病院受診時に、医師に発症日の相談、確認をしてもらってください。

処方された薬によっては、解熱が早い場合がありますが、ウイルスはまだ感染者の体内にあり、自己判断での利用開始は他の利用者への感染が懸念されますので、必ず医師の判断、指示に従ってください。(診断書の提出は必要ありません。)

利用者のご家族がインフルエンザに罹患した場合は、発症の日を含め2日経過後から利用していただきます。本人が休むことにより危険を伴う場合は、家族の了承を得て個室又は静養室での対応とさせていただきます。

サービス利用時に発熱が37.5℃以上ある場合は、個室又は静養室で休んでいただき、ご家族に連絡します。インフルエンザ罹患の可能性が高い場合は病院受診を勧めてください。

※例

		発症日	発症後							
		0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
例1	発症後1日目に解熱した場合	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	発症後4日目	発症後5日目			
		利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用可能		
例2	発症後2日目に解熱した場合	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	発症後5日目			
		利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用可能		
例3	発症後3日目に解熱した場合	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目			
		利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用可能		
例4	発症後4日目に解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目		
		利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用可能		
例5	発症後5日目に解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	
		利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用休止	利用可能	利用可能	